Инсулинотерапия

С момента установления диагноза пациенты с сахарным диабетом 2-го типа (СД 2) должны быть осведомлены о возможном назначении инсулина с учетом прогрессирующего течения заболевания.

Показания

1. У лиц с впервые выявленным СД 2 – при уровне гликированного гемоглобина (HbA_{1c}), превышающем индивидуальный целевой уровень более чем на 2,5%, и наличии выраженной клинической симптоматики метаболической декомпенсации (возможно временное назначение инсулинотерапии).
2. У лиц с анамнезом СД 2 – при отсутствии достижения индивидуальных целей гликемического контроля на фоне лечения оптимальными дозами других сахароснижающих препаратов или их комбинаций.
3. При наличии противопоказаний к назначению или непереносимости других сахароснижающих препаратов.
4. При кетоацидозе и гиперосмолярном гипергликемическом состоянии.
5. При оперативных вмешательствах, острых интеркуррентных и обострении хронических заболеваний, сопровождающихся нецелевыми уровнями гликемического контроля (возможен временный перевод на инсулинотерапию); во время беременности.

Источник:

Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом / под ред. И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, О.Ю. Сухаревой. 12-й выпуск. М., 2025.

DigitalDoctor