

ПРОСУЛЬПИН (СУЛЬПИРИД)

Пусть будет ясно на душе

ВОЗМОЖНОСТИ СУЛЬПИРИДА ПРИ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНОЙ ПАТОЛОГИИ



10.4%

распространенность
депрессии¹

10.5%

распространенность
различных тревожных
расстройств¹

5%

распространенность
генерализованных
тревожных
расстройств²

Тревожно-депрессивные расстройства

- Фактор риска по развитию разных форм химической зависимости¹
- Отягеляют течение практических всех сопутствующих заболеваний¹
- Сопряжены с повышенной смертностью¹
- Главный фактор суицидов – депрессивные расстройства¹

ВОЗМОЖНОСТИ СУЛЬПИРИДА ПРИ КУПИРОВАНИИ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РЕАКЦИЙ

СУЛЬПИРИД



Оказывает нейролептическое, активирующее (антиастеническое) и антидепрессивное действие³



Применяется в лечении атипичных гипотимических состояний (с преобладанием анергии, вялости, чувства бессилия), «маскированных» (с выявлением различных соматизированных проявлений), реактивных депрессий^{3,5,7}



Активность сопоставима с эффектом некоторых антидепрессантов³



РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО НЕКОНТРОЛИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОСУЛЬПИНА (СУЛЬПИРИД) ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНОЙ ПАТОЛОГИИ НА БАЗЕ НЦПЗ РАМН

1 На фоне приема препарата Просульпин (сульпирид) зафиксировано клиническое улучшение³

2 Произошло отчетливое снижение общего уровня тревоги к 3 неделе терапии³

3 Отмечена динамика баллов по госпитальной шкале тревоги и депрессии, свидетельствующая о снижении средних значений выраженности тревожных и депрессивных расстройств³

4 Не отмечено нарушения гормональной сферы и сексуальной активности больных³



ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НА БАЗЕ НЦПЗ РАМН:

- ✓ Результаты свидетельствуют о высокой психотропной активности Просульпина (сульпирид)³
- ✓ Просульпин (сульпирид) – это эффективное средство в терапии коморбидной тревожной и депрессивной патологии, в частности, нозогенных реакций^{3,5,6}
- ✓ Применение Просульпина (сульпирид) сопровождается быстрым развитием терапевтического эффекта^{3,5,6}
- ✓ Просульпин (сульпирид) обеспечивает высокую комплаентность и не оказывает отрицательного влияния на течение соматической патологии (ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, бронхиальная астма, обструктивный бронхит)^{3,5}
- ✓ Просульпин (сульпирид) не вступает в клинически значимые взаимодействия с медикаментами, применяющимися для лечения сердечно-сосудистой и бронхолегочной патологии^{3,5}
- ✓ Просульпин (сульпирид) – это современный антипсихотик для лечения тревожно-депрессивных расстройств различного генеза^{3,5,6,7}

**Просульпин – сульпирид европейского производства
с собственной доказательной базой⁴⁻⁸**

ПРОСУЛЬПИН (СУЛЬПИРИД)

Пусть будет ясно на душе

ПРОСУЛЬПИН
(СУЛЬПИРИД)
В ПРОДАЖЕ!



АРТЕКА.RU



ЛП-№(002396)-(РГ-РУ) от 23.05.2023

1. Жаткина, И. Н. Распространенность и выраженность тревожно-депрессивных расстройств у больных неврологического профиля. Огорев-Online, 2014. 14 (28), 10.

2. Генерализованное тревожное расстройство. Клинические рекомендации. 2024

3. А.Б.Смулевич, Н.А.Ильина, К.А.Батурина. Терапия тревожно-депрессивных расстройств в психиатрической и общемедицинской сети: опыт применения препарата «Просульпин». Психиатрия и психофармакотерапия им. П.Б.Ганнушкина. 2004.-N 3.-C.128-130.

4. Инструкция по медицинскому применению препарата Просульпин, ЛП-№(002396)-(РГ-РУ) от 23.05.2023

5. Д.И. Трухан. Тревожно-депрессивные расстройства у гастроэнтэрологических пациентов в амбулаторно-поликлинической практике. Фармация и фармакология. Приложение 1, 2015. 116-117.

6. Дробижев М. Ю., Кикта С. В., Мачильская О. В. Кардиопсихиатрия. Проблемы перевода. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2016; 15(4): 88-97.

7. Депрессивный эпизод. Рекуррентное депрессивное расстройство. Клинические рекомендации РФ 2024

8. М.А. Бутов, П.С. Кузнецов, Ю.О. Еремина. Влияние сульпирода на вегетативную регуляцию у больных хроническим некалькулезным холециститом с билиарными дисфункциями. Российский медико-биологический вестник имени академика И.П.Павлова, №4, 2006:32-35.

Уполномоченный представитель держателя РУ в РФ:

АО «ПРО.МЕД.ЦС», 115193, г. Москва, ул. 7-я Кожуховская, д. 15, стр. 1.

Тел./факс: (495) 679-07-03, (985) 993-04-15; info@promedcs.ru

Дата одобрения: 18.12.2025

Реклама

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ