

# Тактика лечения пациентов с розацеа



**1** ШАГ

Пациент с эритематозно-телеангиэктатической розацеа

**2** ШАГ

Наружная терапия азелаиновой кислотой

**3** ШАГ

Достигнут регресс?  
ДА: продолжить поддерживающую терапию азелаиновой кислотой  
НЕТ: лазерные и световые технологии

**4** ШАГ

Поддерживающая терапия азелаиновой кислотой

**5** ШАГ

Пациент с папуло-пустулезной розацеа

**1** ШАГ

Продолжить наблюдение у дерматовенеролога

**2** ШАГ

Достигнут регресс?  
ДА: продолжить поддерживающую местную терапию  
НЕТ: системная терапия изотретиноином

**3** ШАГ

Наружная терапия азелаиновой кислотой или ивермектином или метронидазолом в сочетании с системными тетрациклинами

**4** ШАГ

Продолжить наблюдение у дерматовенеролога

**1** ШАГ

Пациент с фиматозной розацеа

**2** ШАГ

Воспалительные высыпания?  
НЕТ: хирургическое лечение и или лазерные технологии  
ДА: системная терапия изотретиноином

**3** ШАГ

Достигнут регресс?  
ДА: наблюдение у дерматовенеролога  
НЕТ: системная терапия изотретиноином

**4** ШАГ

Продолжить наблюдение у дерматовенеролога