

Некоторые ситптоты опасности, их воэтожные причины и рекотендуетая врачебная тактика у пациентов с болью в спине

Симптомы опасности	Возможные причины боли	Врачебная тактика
 Злокачественное новообразование в анамнезе Необъяснимая потеря массы тела Возраст старше 50 лет Появление или усиление боли в покое, в ночное время 	Злокачественное новообразование	 МРТ или КТ позвоночника (один отдел) В части случаев – сцинтиграфия костей всего тела, позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) костей, совмещенная с КТ всего тела Консультация врача-онколога
✓ Лихорадка✓ Недавно перенесенное инфекционное заболевание✓ Парентеральное употребление наркотиков	Инфекционное поражение позвонков или дисков	 № Рентгенография поясничного и крестцового отделов позвоночника функциональными пробами функциональными пробами функциональными пробами функциони катра, мерт или КТ позвоночника (один отдел) функциониста функциониста функциониста функциониста функциониста.
	Синдром поражения корешков конского хвоста	✓ МРТ или КТ позвоночника (один отдел)✓ Срочная консультация врача-нейрохирурга
 ≪ Наличие признаков остеопороза ≪ Прием ГК ≪ Возраст старше 50 лет ≪ Недавняя травма спины 	Компрессионный перелом позвоночника	 ✓ Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника ✓ Рентгенография позвоночника с функциональными пробами ✓ МРТ или КТ позвоночника (один отдел) ✓ Ультразвуковая денситометрия ✓ Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника ✓ Консультация врача-ревматолога
 ✓ Утренняя скованность ✓ Молодой возраст ✓ Пробуждение во второй половине ночи из-за боли ✓ Улучшение после физических упражнений на фоне приема НПВП 	Анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева)	 ✓ Рентгенография поясничного и крестцового отделов позвоночника ✓ Рентгенография позвоночника с функциональными пробами ✓ Консультация врача-ревматолога
≪ Наличие пульсирующего образования в брюшной полости	Аневризма брюшного отдела аорты	 Ўльтразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) КТ органов брюшной полости Консультация врача-хирурга
≪ Выраженная или нарастающая слабость в ногах	Поясничный стеноз	✓ МРТ или КТ позвоночника (один отдел)✓ Консультация врача-нейрохирурга

Примечание. MPT – магнитно-резонансная томография; КТ – компьютерная томография; ГК – глюкокортикоиды; НПВП – нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты.