


Алгоритм действия врача при язвенной болезни



*Антитела против *H. pylori* IgG или уреазный дыхательный тест, или CLO-тест, или кал на антиген к *H. pylori*, или кал на ДНК (ПЦР) *H. pylori*.

**Уреазный дыхательный тест, или CLO-тест, или кал на антиген к *H. pylori*, или кал на ДНК (ПЦР) *H. pylori*.

Примечание: ЭГДС – эзофагогастродуоденоскопия; ИПП – ингибиторы протонной помпы; ГКС – глюкокортикоиды; НПВС – нестероидные противовоспалительные средства; IgG – иммуноглобулин G; ПЦР – полимеразная цепная реакция; CLO-тест (*Campylobacter-like organism test*) – это быстрый диагностический метод для выявления бактерии *Helicobacter pylori*.

Источник:

Язвенная болезнь. Взрослые: клинические рекомендации. Общероссийская общественная организация «Российская гастроэнтерологическая ассоциация», Общероссийская общественная организация «Российское общество хирургов», Общероссийская общественная организация «Российское общество колоректальных хирургов», Ассоциация «Эндоскопическое общество „РЭндО“», Общероссийская общественная организация «Научное сообщество по содействию клиническому изучению микробиома человека». 2024.