


ТРИ КЛЮЧЕВЫХ КОМПОНЕНТА — ОДНА УНИКАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ



СКЕЛЕТНО-МЫШЕЧНЫЕ (НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ) БНЧС: ЦИФРЫ И ФАКТЫ¹



СКЕЛЕТНО-МЫШЕЧНАЯ БНЧС

ХАРАКТЕРНО

- ✓ появление после физической нагрузки, неловкого движения или длительного пребывания в неудобном положении
- ✓ ноющий характер
- ✓ различная интенсивность
- ✓ усиление при движении в поясничном отделе позвоночника, в определенных позах, при ходьбе
- ✓ ослабление в покое

НЕ ХАРАКТЕРНО

- ✓ распространение в живот, промежность, половые органы
- ✓ при неврологическом обследовании – признаки радикулопатии и других неврологических заболеваний (парезы, утрата или снижение рефлексов, расстройство чувствительности, тазовые нарушения и др.)

ПРЕПАРАТЫ, НАЗНАЧАЕМЫЕ ПРИ БНЧС И ФИГУРИРУЮЩИЕ В ДЕЙСТВУЮЩИХ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ:

1

НПВП рекомендуются при острой, подострой или обострением хронической БНЧС (УДД – 1, УУР – А), поскольку облегчают боль и повышают функциональную активность пациентов¹

2

ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В рекомендуются в дополнение к НПВП при острой неспецифической БНЧС (УДД – 1, УУР – А), потому что имеются данные об усилении противоболевого действия при комбинации витаминов группы В и НПВП [1]

КОМБИНАЦИЯ ДИКЛОФЕНАКА С ВИТАМИНАМИ ГРУППЫ В ЭФФЕКТИВНЕЕ МОНОТЕРАПИИ ДИКЛОФЕНАКОМ ПРИ СОПОСТАВИМЫХ ПРОФИЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ⁵

ФЛЕКСОМИТРИЛ®

ИННОВАЦИОННЫЙ, С УНИКАЛЬНЫМ СОЧЕТАНИЕМ КОМПОНЕНТОВ ПРЕПАРАТ^{2,6}, КОТОРЫЙ ВЛИЯЕТ НА КЛЮЧЕВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ БОЛИ В СПИНЕ²



1 АМПУЛА
1 РАЗ В СУТКИ

2 ДНЯ

Раствор
для внутримышечного
введения

75 МГ
В АМПУЛЕ

2 МГ
В АМПУЛЕ

10 МГ
В АМПУЛЕ

ДИКЛОФЕНАК
в терапевтической концентрации обладает противовоспалительным и анальгетическим действием²

БЕТАМЕТАЗОН
в низкой концентрации оказывает противовоспалительное действие и уменьшает иммунопатологический компонент³ при благоприятном профиле безопасности⁴

ГИДРОКСОКОБАЛАМИН
способствует регенерации нервных волокон, в высоких дозах обеспечивает дополнительный обезболивающий эффект²

ФЛЕКСОМИТРИЛ –

СИНЕРГИЯ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ НЕОТЛОЖНОЙ ТЕРАПИИ
БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ДОРСАЛГИИ

БНЧС – боли в нижней части спины, НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты, УДД – уровень достоверности доказательств, УУР – уровень убедительности рекомендаций.

1. Скелетно-мышечные (неспецифические) боли в нижней части спины. Клинические рекомендации МЗ РФ. 2023
2. Мубаракшина О.А., Дронова Ю.М., Чернов С.Ю. и др. Новые возможности комбинированных лекарственных препаратов в лечении острых скелетно-мышечных болевых синдромов. Терapeutic. 2025; (7):136-46.
3. Регистрационное удостоверение. Флексомитрил®. URL: https://grls.minzdrav.gov.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=94d6ffd0-22e6-407e-8d83-9568c334da7d (дата обращения: 24.03.2026).
4. Нуриахметов А.Н., Ахтямов И.Ф., Цыплаков Д.Э. и др. Дозозависимое влияние бетаметазона на суфаванг (экспериментальное исследование). Гений ортопедии. 2021;27(1):80-6.
5. Mibielli MA, Geller M, Cohen JC, Goldberg SG, Cohen MT, Nunes CP, Oliveira LB, da Fonseca AS. Diclofenac plus B vitamins versus diclofenac monotherapy in lumbago: the DOLOR study. Curr Med Res Opin. 2009 Nov;25(11):2589-99.
6. <https://grls.minzdrav.gov.ru> доступ от 24-03-2026.