

# Медикаментозные средства, используемые в комплексном лечении прогрессирующей близорукости. Шпаргалка.



Действие	Препараты	Способ применения и дозы
Антихолинэргические средства – воздействие на цилиарную мышцу	Циклопентолат 1%#, Тропикамид** 0,5–1%#	По 1–2 капле 1 раз в день на ночь, 2–4 недели, курсами 4 раза в год
Симпатомиметики – стимуляция радиальных волокон Иванава цилиарной мышцы	Фенилэфрин** 2,5%	По 1–2 капле 1 раз в день на ночь, 2–4 недели, курсами 4 раза в год
<b>Трофическая терапия при осложненной миопии</b>		
Препараты для стимуляции обменных процессов и нормализации функций клеточных мембран	Метилэтилпиридинол 1%	По 1–2 капле 3 раза в день, 2–4 недели, курсами 4 раза в год
Сосудорасширяющие препараты	Никотиновая кислота#	Внутрь по 5 мг в день, курсами 3–4 недели
Активаторы синтеза коллагена	Депротенинизированный гемодериват крови телят#	2 мл, 1 раз в день, в/м 10 дней
Лекарственные средства и витаминно-минеральные комплексы содержащие:	Витамины и витаминоподобные средства, Гинкго двулопастного листьев экстракт, микроэлементы: селен, цинк, медь, кальций	По 1 табл. 1–2 раза в день, 2–3 мес, 2 раза в год
Ноотропные препараты	Никотиноил гамма-аминомасляная кислота#	Внутрь по 2 мг, 2–3 раза в день, 1–2 мес
Препараты, улучшающие регенерацию тканей сетчатки	Полипептиды сетчатки глаза скота	5 мг парабульбарно или в/м, 1 раз в день, 10 дней, повторный курс через 3–6 мес

По данным: Клинические рекомендации. Миопия. Общероссийская общественная организация «Ассоциация врачей офтальмологов». 2017; 46

Материал принадлежит ООО "ММА"МедиаМедика", любое копирование и использование в коммерческих целях запрещено. Предназначено исключительно для специалистов здравоохранения.