

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ВРАЧА ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНЫЙ КОЛИТ

ДИАРЕЯ

(≥3 эпизодов жидкого стула, по Бристольской шкале 6–7) в течение 24 ч (в сочетании с болью в животе)

ПЦР – скрин кала на ДНК/РНК возбудителей кишечных инфекций (вирусы, бактерии), микроскопия фекалий на простейшие и яйца гельминтов

Положительный результат

Лечение ОКИ

Отрицательный результат

Нет

Наличие факторов риска инфекции *Clostridioides difficile*

Есть

Наличие факторов риска инфекции *Clostridioides difficile* Определение ДНК возбудителя *C. difficile* и генов токсинов или ГДГ в образцах фекалий (ПЦР)

Положительный результат

Отрицательный результат

Отрицательный результат

Исследование кала на токсины А и В клостридии (ИХА)

Повторное тестирование через 7 дней при ухудшении состояния

Положительный результат

Лечение инфекции *C. difficile*

Примечание: ПЦР – полимеразная цепная реакция; ОКИ – острая кишечная инфекция; ГДГ – глутаматдегидрогеназа; ИХА – иммунохроматографический анализ.

Источник: Энтероколит, вызванный *Clostridioides difficile* (*C. difficile*). Клинические рекомендации Минздрава России. М., 2024. https://cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/878_1