

Батский индекс активности анкилозирующего спондилита (индекс BASDAI)



Ответьте на приведенные ниже вопросы, касающиеся Вашего состояния и самочувствия на протяжении прошедшей недели, сделав отметку в соответствующем поле (обведите соответствующую цифру).

Как бы Вы расценили уровень общей слабости (утомляемости) за последнюю неделю?

Не было

Очень выраженная



Как бы Вы расценили уровень боли в шее, спине или тазобедренных суставах за последнюю неделю?

Не было

Очень выраженная



Как бы Вы расценили уровень боли (или степень припухлости) в суставах (помимо шеи, спины или тазобедренных суставов) за последнюю неделю?

Не было

Очень выраженная



Как бы Вы расценили степень неприятных ощущений, возникающих при дотрагивании до каких-либо болезненных областей или давлении на них (за последнюю неделю)?

Не было

Очень выраженная



Как бы Вы расценили степень выраженности утренней скованности, возникающей после просыпания (за последнюю неделю)?

Не было

Очень выраженная



Как долго длится утренняя скованность, возникающая после просыпания (за последнюю неделю)?

Не было

2 ч и более



Расчет индекса BASDAI:

Рассчитывается сумма значений для вопросов 1–4 и прибавляется среднее значение для вопросов 5 и 6. Полученный результат делится на 5.

Ключ (интерпретация):

Оценка полученных значений:

<4 без нарушения функции соответствует низкой активности псориатического спондилита;

>4 без нарушения функции и BASDAI (БАСДАЙ) <4 в сочетании с нарушением функции – умеренной;

>4 в сочетании с нарушением функции – соответствует высокой активности.

Пояснение: Уменьшение индекса на 50% свидетельствует о наличии ответа на терапию.

Источник:

1. Taylor W.J., Harrison A.A. Could the bath ankylosing spondylitis disease activity index (BASDAI) be a valid measure of disease activity in patients with psoriatic arthritis? *Arthritis Rheum.* 2004; 51(3): 311–315.
2. Fernandez-Sueiro J.L., Willisch A., Pertega-Diaz S. et al. Validity of the bath ankylosing spondylitis disease activity index for the evaluation of disease activity in axial psoriatic arthritis. *Arthritis Care Res.* 2010; 62(1): 78–85.
3. Псориаз артропатический. Псориатический артрит. Клинические рекомендации, 2021г. Разработчик клинической рекомендации: Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов", Ассоциация ревматологов России. Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава РФ