

Дифференциальная диагностика бронхиальной астмы и обструктивного бронхита у детей раннего возраста с обструктивным синдромом на фоне ОРВИ



Признаки			Бронхиальная астма	Обструктивный бронхит
А	1	Возраст	Старше 1,5 лет	Менее 1 года
	2	Обструктивный синдром появился	В 1–2-е сутки ОРВИ	На 3-й день ОРВИ и позднее
	3	Длительность обструктивного синдрома	Менее 2 сут	4 сут и более
	4	Ранее обструктивный синдром отмечался	2 раза и более	Не отмечался или был однократно
	5	Наследственная отягощенность аллергическими заболеваниями	Есть	Нет
	6	В том числе бронхиальная астма по материнской линии	Есть	Нет
	7	В анамнезе аллергические реакции на пищевые продукты, медикаменты, профилактические прививки	Есть	Нет
	8	Токсикоз II половины беременности у матери	Был	Нет
	9	ОРВИ во время беременности у матери	Имела место	Нет
	10	Сырость в квартире	Есть	Нет
Б	11	Абс. число эозинофилов, $\times 10^9/\text{л}$	$\geq 0,350$	$< 0,350$
	12	Нейтрофилы, %	≥ 45	< 45
	13	Лимфоциты, %	< 45	≥ 45
	14	Абс. число лимфоцитов, $\times 10^9/\text{л}$	$< 3,0$	$\geq 3,0$