

Возможности лечения остеоартрита:

международные рекомендации и отечественный опыт



Клинические рекомендации АТОР/АРР 2021

Тазобедренные суставы

Нелекарственные методы лечения

+

Хондроитин сульфат и/или глюкозамин или пиаסקледин или **диацереин**

Системные НПВП

Трамадол/дулоксетин

Хирургическое лечение

Коленные суставы

Нелекарственные методы лечения

+

Хондроитин сульфат и/или глюкозамин или пиаस्कледин или **диацереин**

Местные НПВП

Системные НПВП

Трамадол/дулоксетин

Хирургическое лечение

! Чрезмерное использование инъекций при наличии форм для приема внутрь – одна из ведущих причин нерационального применения лекарств!

ДИАРТРИН КАПСУЛЫ ДИАЦЕРЕИНА 50 МГ

ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ДИАЦЕРЕИНА¹

Блокада хемокина CXCL-13

Противовоспалительное действие

Ингибирование NAAA

Ингибирование глутаматэргической нейротрансмиссии

Увеличение показателя пальмитоилэтаноламида

АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Невропатическая боль

Ноцицептивная боль

Боль при воспалении и анти-ноцицептивный эффект

Диацереин: рабочая группа ESCEO 2016²

РКИ демонстрируют сходную эффективность диацереина и НПВП (профилактика обострений!).

Диацереин имеет приемлемый профиль безопасности, в особенности по сравнению с НПВП и парацетамолом.

Рекомендовано включить диацереин в препараты первой* линии для лечения ОА тазобедренных и коленных суставов.

Профиль пациента для назначения Диартрина:

- ✓ Пациент с ОА коленных и/или тазобедренных суставов, желающий профилактически снизить частоту обострений ОА и не получавший лечение.
- ✓ Неэффективность/непереносимость других SYSADOA в анамнезе.
- ✓ Пациент с противопоказаниями к НПВП:
 - сердечно-сосудистые заболевания;
 - язвенная болезнь желудка и/или 12-перстной кишки;
 - хроническая болезнь почек.

1 По 1 капсуле 1 раз в приемом с приемом пищи 2-4 недели.

Далее

2 По 1 капсуле утром и вечером с приемом пищи.

Непрерывно длительно или курсами не менее 4-х месяцев.

НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты, АРР – Ассоциация ревматологов России, АТОР – Ассоциация травматологов-ортопедов России, NAAA – кислая амидаза N-ацилэтаноламина (N-Acylethanolamine Acid Amidase), ESCEO – Европейское общество по клиническим и экономическим аспектам остеопороза и остеоартрита (European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis), РКИ – рандомизированное контролируемое исследование, ОА – остеоартроз, или остеоартрит, SYSADOA – симптоматические медленно действующие препараты против остеоартрита

*Согласно ESCEO 2019, диацереин - вторая линия среди SYSADOA при ОА коленных суставов

1. Almezgagi M, Zhang Y, Hezam K, Shamsan E, Gamah M, Al-Shaebi F, Abbas AB, Shoaib M, Saif B, Han Y, Jia R, Zhang W. Diacerein: Recent insight into pharmacological activities and molecular pathways. Biomed Pharmacother. 2020 Nov; 131:110594
 2. Pavelka K, Bruyere O, Cooper C, Kanis JA, Leeb BF, Maheu E, Martel-Pelletier J, Monfort J, Pelletier JP, Rizzoli R, Reginster JY. Diacerein: Benefits, Risks and Place in the Management of Osteoarthritis. An Opinion-Based Report from the ESCEO. Drugs Aging. 2016 Feb;33(2): 75-85. doi: 10.1007/s40266-016-0347-4. Erratum in: Drugs Aging. 2017 May;34(5):413. doi: 10.1007/s40266-017-0457-7. PMID: 26849131; PMCID: PMC4756045.