


Краеугольный камень успешной эрадикации *Helicobacter pylori*



Патоморфологические изменения при инфекции *H. pylori*



Эффективная эрадикация *H. pylori* для лечения гастрита и профилактики долгосрочных осложнений и рецидивов болезни

Кому может понадобиться эрадикационная терапия?

- Пациентам с хроническим гастритом*** в качестве **этиологического** лечения^{1,2}.
- Пациентам с атрофическим гастритом** для **лечения и предотвращения** прогрессирования атрофии^{1,2}.
- Пациентам с язвенной болезнью** в качестве **этиологического** лечения^{1,2}.



Меры повышения эффективности эрадикации^{3,4}

- Продолжительности эрадикационной терапии *H. pylori* до 14 дней.
- Назначение современного ИПП — рабепразола и эзомепразола.
- Назначение высокой дозы ИПП.
- Включение в эрадикационную терапию *H. pylori* **ребамипида (Гастростат®)**.
- Повышение приверженности пациентов эрадикационной терапии инфекции *H. pylori*.
- Включение в схему эрадикационной терапии *H. pylori* висмута трикалия дицитрата.
- Включение в схему эрадикационной терапии *H. pylori* пробиотика.

Ребамипид (Гастростат®) включен во все клинические рекомендации по терапии *H. Pylori*-ассоциированных язвенной болезни и гастрита/дуоденита

- Добавление ребамипида к схемам эрадикации **повышает** их эффективность, в частности, существенно увеличивается частота устранения *H.pylori*^{1,2}.
- Эффективность ребамипида для заживления эрозивного гастрита **доказана** в клинических исследованиях в том числе рандомизированных^{1,2}.
- Пациентам с хроническим гастритом и симптомами диспепсии для купирования симптомов **рекомендуется** лечение ребамипидом как в монотерапии, так и в составе комплексного лечения^{1,2}.
- Пациентам с обострением ЯБ с целью ускорения сроков заживления язв и улучшения качества образующегося рубца **рекомендуется** применение ребамипида^{1,2}.



Результаты метаанализа контролируемых исследований

- Добавление ребамипида в схемы эрадикации (в том числе к тройной) **достоверно повышает эффективность** лечения: обобщенная эффективность эрадикации составила 90,3% у пациентов⁵.
- Ребамипид **ингибирует адгезию *H. pylori* к эпителиальным клеткам слизистой оболочки желудка и оказывает противовоспалительное действие** (снижение продукции интерлейкина-8, индуцированной *H. pylori*)⁵.
- В группах, принимавших ребамипид, отмечено **снижение частоты побочных явлений** на границе статистической значимости⁵.

100 мг дозировка

3 раза в сутки

2-4 недели

до 8 недель непрерывный курс приема

*Хронический гастрит - группа хронических заболеваний, которые морфологически характеризуются персистирующим воспалительным инфильтратом и нарушением клеточного обновления с развитием кишечной метаплазии, атрофии и эпителиальной дисплазии в слизистой оболочке желудка.

**С положительными результатами тестирования на инфекцию *H.pylori*.

Подготовлено по выступлению д.м.н., проф. Зольниковой О. Ю. и к.м.н., проф. Гончаренко А. Ю. в рамках интерактивной онлайн-программы «МЕДэксперт. Гастроэнтерология»

1. Клинические рекомендации МЗ РФ от 2021 года. Гастрит и дуоденит.
2. Клинические рекомендации МЗ РФ от 2022 года. Язвенная болезнь.
3. Ивашкин В.Т., Лапина Т.Л., Маев И.В., Драпкина О.М., и др. Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации, Научного сообщества по содействию клиническому изучению микробиома человека, Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний, Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии по диагностике и лечению *H. pylori* у взрослых. РЖГГК. 2022;32(6):72-93.
4. Ивашкин В.Т. и др. Клинические рекомендации 2024г. по гастриту и дуодениту Российской гастроэнтерологической ассоциации, ассоциация «Эндоскопическое общество РЭНДО», Научное сообщество по содействию клиническому изучению микробиома Человека, межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии https://cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/708_2
5. Андреев Д.Н., Маев И.В., Бордин Д.С., Лямина С.В., Дичева Д.Т., Фоменко А.К., Багдасарян А.С. Эффективность включения ребамипида в схемы эрадикационной терапии инфекции *Helicobacter pylori* в России: метаанализ контролируемых исследований. Consilium Medicum. 2022

M-M-GST-2025_11-760