

# Режим антикоагулянтной терапии гепарином натрия и оральными антитромботическими средствами



## Определение режима антикоагулянтной терапии

Профилактические дозы гепарина натрия	Гепарин натрия 5000–7000 ЕД подкожно каждые 12 ч в I триместре
	Гепарин натрия 7500–10000 ЕД подкожно каждые 12 ч во II триместре
	Гепарин натрия 10 000 ЕД подкожно каждые 12 ч в III триместре, если АЧТВ повышен
	Дозирование гепарина натрия в возрасте до 18 лет – следует подбирать индивидуально, с учетом показателей свертываемости крови (целевой уровень АЧТВ 60–85 с)
Рекомендованные терапевтические дозы гепарина натрия	Гепарин натрия 10 000 ЕД подкожно каждые 12 ч или более в дозах, рекомендованных для целевых значений АЧТВ в терапевтическом диапазоне (1,5–2,5х контроль) через 6 ч после инъекции
Послеродовые антитромботические средства	Оральные антитромботические средства могут быть использованы строго в зависимости от терапии, лактации и предпочтений пациента в соответствии с инструкциями по медицинскому применению к каждому их них

Примечание. АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время.

**Материал подготовлен на основании:** Венозные осложнения во время беременности и послеродовом периоде. Акушерская тромбоземболия. Клинические рекомендации. Российское общество акушеров-гинекологов, Корпоративная некоммерческая организация «Ассоциация анестезиологов-реаниматологов», Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов, 2022 год.