


ВЫБОР ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО САХАРОСНИЖАЮЩЕГО ПРЕПАРАТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОМИНИРУЮЩЕЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

Метформин является терапией первой линии для инициации лечения и основой любой комбинации сахароснижающих средств для большинства пациентов.



Примечание. АССЗ – атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания, ХБП – хроническая болезнь почек, ХСН – хроническая сердечная недостаточность, арГПП-1 – агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1, иНГЛТ-2 – ингибитор натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа, ФВЛЖ – фракция выброса левого желудочка, иДПП-4 – ингибитор дипептидилпептидазы-4, ТЗД – тиазолидинионы.

¹Указания на высокий риск АССЗ: возраст ≥55 лет с наличием 50% стеноза коронарных, каротидных артерий или артерий нижних конечностей или гипертрофия левого желудочка.

Источник: Сахарный диабет 2-го типа у взрослых. Клинические рекомендации Минздрава России. М., 2024. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/290_2