

СОВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И АЛГОРИТМЫ ПОДЧЕРКИВАЮТ МЕТАБОЛИЧЕСКУЮ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ ИНДАПАМИДА И АКТУАЛИЗИРУЮТ ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫМ ЕГО РЕКОМЕНДОВАНО НАЗНАЧИТЬ¹⁻⁴:

СТАРТОВАЯ ТЕРАПИЯ АГ

1



Очень пожилым пациентам или пожилым пациентам со старческой астенией¹⁻⁴



2

Пациентам с низким риском ССО и АД <150/90 мм рт.ст.¹⁻⁴

ДЛЯ ТАКИХ ПАЦИЕНТОВ ПОДХОДИТ ДЕЛИМАЯ ТАБЛЕТКА ИНДАП®, КОТОРАЯ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СТАРТОВАТЬ С **0,625 МГ** ИНДАПАМИДА



ИНДАП – ТАБЛЕТКА, ДЕЛИМАЯ НА 4 РАВНЫЕ ЧАСТИ (0,625 → 1,25 → 1,875 → 2,5 МГ) – ЭТО ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР, КОГДА ТРЕБУЕТСЯ МИНИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ ДОЗА¹⁻⁴



ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ В КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ АГ, ПОДХОДИТ **ИНДАП В КАПСУЛАХ С ФИКСИРОВАННОЙ ДОЗИРОВКОЙ 2,5 МГ ИНДАПАМИДА¹⁻⁴**




В СЛУЧАЯХ, КОГДА НЕОБХОДИМО ТИТРОВАТЬ ДОЗУ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ АГ, УДОБЕН **ИНДАП В ТАБЛЕТКАХ¹⁻⁴**



ДВОЙНАЯ ИЛИ ТРОЙНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ

Пациентам с риском ССО выше умеренного и АД > 150/90 мм рт.ст.¹⁻⁴



ВАЖНО ЗНАТЬ,

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ АГ ИНДАПАМИД СОХРАНЯЕТ МЕТАБОЛИЧЕСКУЮ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ¹⁻⁴

Дозы 0,625 и 1,25 мг способствуют большей безопасности индапамида¹⁻⁴

ЕДИНСТВЕННЫЙ ИНДАПАМИД С КАПСУЛОЙ И ДЕЛИМОЙ ТАБЛЕТКОЙ⁵

ИНДАП КАПСУЛА
когда требуется 2,5 мг индапамида



ИНДАП ТАБЛЕТКА
когда необходимо титровать дозу



ТАБЛЕТКА 2,5 МГ, ДЕЛИМАЯ НА 4 РАВНЫЕ ЧАСТИ



1. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. J Hypertens

2. Артериальная гипертензия. Алгоритмы диагностики и лечения. Терапия. 2022; 5 (приложение): 78–101.

3. А.В. Сыров. Индапамид в лечении артериальной гипертензии. Терапия. 2023; 9(4): 162–172

4. Трухан Д.И., Багишева Н.В. Рациональная фармакотерапия артериальной гипертензии в реальной клинической практике: диуретики сквозь призму лекарственной безопасности. Клинический разбор в общей медицине. 2023; 4 (4): 48–59.

5. Государственный реестр лекарственных средств

<https://grls.minzdrav.gov.ru/grls.aspx?s=%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BF&m=TradeName>