

Дифференциальная диагностика гриппа и других ОРВИ

Критерий	Нозологическая форма острого респираторного заболевания					
	Грипп	Парагрипп	Аденовирусное	РС-вирусное	Риновирусное	Энтеровирусное
Эпидемические предпосылки	Эпидемия, контакт с больным	Контакт с больным	Контакт с больным, ИДС, переохлаждение	Контакт с больным, ИДС, детский возраст	Контакт с больным	Контакт с больным, употребление сырой воды
Возраст	Любой	Детский	Любой	Дети до 1 года	Любой	Любой
Сезон	Зима – весна	Круглый год (чаще зима – весна)	Круглый год (чаще осень, весна)	Зима – весна	Круглый год	Круглый год (чаще лето – осень)
Инкубационный период	6–48 ч (чаще 12–24 ч)	2–7 дней	4–14 дней	2–7 дней	1–6 дней	2–10 дней
Начало болезни	Острое	Подострое, постепенное	Подострое, постепенное	Подострое, постепенное	Острое	Подострое, постепенное
Выраженность СОИИ	++++	+ (при осложнениях ++)	+ (при осложнениях +++)	+ (при осложнениях +++)	–	+ (при осложнениях +++)
Лихорадка (выраженность, длительность, тип)	Острая, фебрильная, постоянная	Острая, субфебрильная, постоянная	Острая или подострая, фебрильная, волнообразная	Острая или подострая, субфебрильная, постоянная	Отсутствует	Острая, фебрильная, постоянная
Ведущий синдром	Трахеит	Ларингит	Фарингит	Бронхит, бронхиолит, пневмония	Ринит	Герпангина
Нереспираторные синдромы	Геморрагический	Нет	Тонзиллит, конъюнктивит, лимфаденопатия (в том числе мезаденит), увеличение печени и/или селезенки, энтерит	Увеличение печени и/или селезенки	Нет	Энтерит, макулопапулезная экзантема, увеличение печени и/или селезенки
Осложнения	Пневмония, синуситы, отиты	Ложный круп, синуситы, отиты	Кератит, пневмония, синуситы, отиты	Острая дыхательная недостаточность	Синуситы	Менингит, миокардит

Примечание. РС – респираторно-синцитиальный; ИДС – иммунодефицитные состояния; СОИИ – синдром общей инфекционной интоксикации.