

Дифференциально-диагностические критерии отравлений, сопровождающихся миозом

При экзогенных отравлениях большое значение имеет выявление симптомов, характерных для воздействия на организм определенных токсических веществ по принципу их «избирательной токсичности».

В ходе диагностики необходимо выделить ведущий клинический синдром (синдромы), что позволяет приблизиться к установлению этиологии отравления. Отправной точкой для диагностики являются следующие симптомы визуальной оценки состояния больного: размер зрачка, уровень изменения сознания, состояние кожных покровов и слизистых оболочек.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОТРАВЛЕНИЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ МИОЗОМ				
Симптомы	Вид психоактивных веществ			
	Опиоиды	Этанол	Барбитураты	Бензодиазепины
Уровень сознания	Угнетено, до комы	Возбуждение сменяется угнетением вплоть до комы	Сонливость; кома	Сонливость; кома
Кожные покровы и слизистые	Бледные, влажные, липкие	Гиперемия сменяется бледностью с обильным потом; гиперсаливация	«Барбитуровый ожог» – пузыри в месте давления	Потливость
Судороги	Есть	Возможны, предвестник комы	Нет, миорелаксация	Нет, миорелаксация
ЧСС и пульс	Брадикардия, нитевидный пульс	Тахикардия сменяется брадикардией	Не изменены	Не изменены
АД	Гипотония	Гипертензия сменяется гипотензией	Гипотония	Гипотония
Дыхание	Угнетено, до апноэ	Тахи- или гипопноэ	Угнетено	Угнетено
Отек легких	Возможен	Нет	Есть	Есть
Бронхорея	Нет	Нет	Нет	Нет
Температура тела	Понижена	Не изменена	Не изменена	Не изменена
Боль в животе	Нет	Нет	Нет	Нет
Диспепсия	Рвота	Нет	Тошнота, рвота	Тошнота, рвота
Экзикоз	Нет	Нет	Нет	Нет
Зрение	Не изменено	Не изменено	Нистагм	Нистагм

Источник: Отравление наркотиками и психодиспептиками. Клинические рекомендации РФ Версия: 2018-2020 (Россия). Ассоциация клинических токсикологов