

# Принципы замены препаратов, изменяющих течение рассеянного склероза (ПИТРС)



Ниже представлены рекомендации для определения действий врача в зависимости от ответа на терапию.

Классификация ответа на терапию 1-й линии	Наличие признаков через 12 мес терапии			Действие	
	Увеличение балла EDSS	Данные активности по МРТ	Данные лабораторных тестов		
Обострения  Резистентность к терапии (с учетом наступления полного терапевтического действия ПИТРС)	1 и более обострений (объективно подтвержденное врачом-неврологом, наличие только повышенной утомляемости или тазовых расстройств не считается обострением)	Подтвержденное усиление инвалидизации (через 90 дней после обострения)	Более 2 характеристик	Не имеет значения	Смена терапии на 2-ю линию
	1 и более обострений (объективно подтвержденное врачом-неврологом, наличие только повышенной утомляемости или тазовых расстройств не считается обострением)	Нет	Более 2 характеристик	Не имеет значения	Рассмотреть возможную смену терапии на 2-ю линию*
	1 и более обострений (объективно подтвержденное врачом-неврологом, наличие только повышенной утомляемости или тазовых расстройств не считается обострением)	Подтвержденное усиление инвалидизации (через 90 дней после обострения)	Не имеет значения	Не имеет значения	Смена терапии на 2-ю линию
	Нет	Подтвержденное прогрессирование инвалидизации (24 нед)	Не имеет значения	Не имеет значения	Смена типа течения и терапии в соответствии с типом течения
	1 обострение (объективно подтвержденное врачом-неврологом, наличие только повышенной утомляемости или тазовых расстройств не считается обострением)	Нет	Нет	Нет	Смена на ПИТРС с другим механизмом действия в рамках 1-й линии
	Нет	Нет (после обострения)	Более 2 характеристик		
Нет	Нет (после обострения)	Нет	Высокий титр нейтрализующих антител к интерферону β		

\*Вариабельность ситуаций, которые могут попадать под данную категорию, очень большая, поэтому лечащий врач принимает решение исходя из конкретной клинической ситуации.

Все критерии применимы на продолжительность периода измерения 12 мес с момента, когда начал действовать ПИТРС. С последующими годовыми интервалами. Попадание одного критерия в первые 12 мес, а второго критерия – во вторые 12 мес измерения должны расцениваться как несостоявшиеся.

Данные критерии применимы только к пациентам с ремиттирующим рассеянным склерозом (не проводились исследования шкал для пациентов с первично-прогрессирующим рассеянным склерозом и вторично-прогрессирующим рассеянным склерозом).

Характеристики активности по данным МРТ – новый очаг в режиме T2-ВИ, или увеличившийся очаг в режиме T2-ВИ, или очаг, накапливающий контрастный препарат в режиме T1-ВИ. Новый очаг, накапливающий контрастное вещество, считается как один очаг.

**Источник:** Рассеянный склероз. Клинические рекомендации МЗ РФ, 2022 г.