

#шпаргалка



Критерии активности системного юношеского артрита (юношеский артрит с системным началом – сЮА) Американской коллегии ревматологов (АКР, 2011)

Юношеский артрит с системным началом без активного суставного синдрома:

Лихорадка и оценка активности болезни врачом по ВАШ **<7 из 10 баллов**

Лихорадка в сочетании с жизнеугрожающими проявлениями болезни (серозит) и оценка активности болезни врачом по ВАШ **>7 из 10 баллов**

Юношеский артрит с системным началом с активным суставным синдромом без активных системных проявлений:

Низкая активность (наличие всех критериев):

- число пораженных суставов ≤ 4
 - СОЭ или СРБ в норме
- оценка активности болезни врачом по ВАШ **<4 из 10 баллов**
- оценка общего состояния пациентом или родителем по ВАШ **<2 из 10 баллов**

Средняя активность (по наличию критериев не соответствует низкой и высокой):

- наличие **>1** критерия низкой степени и **<3** критериев высокой активности

Высокая активность (наличие 3 и более критериев):

- число пораженных суставов **>8**
- СОЭ или СРБ выше нормы **в 2 раза**
- оценка активности болезни врачом по ВАШ **≥ 7 из 10 баллов**
- оценка общего состояния пациентом или родителем по ВАШ **≥ 5 из 10 баллов**

Критерии неактивной болезни/ремиссии (С. Wallace и соавт., 2011)

- Отсутствие суставов с активным артритом.
- Отсутствие лихорадки, сыпи, серозита, спленомегалии или генерализованной лимфаденопатии, типичных для ювенильного артрита; а не типичных?
- Отсутствие активного увеита.
- Нормальный показатель СОЭ и/или С-реактивного белка (СРБ).
- Отсутствие активности болезни по общей оценке врача (по визуальной аналоговой шкале – ВАШ).
- Утренняя скованность меньше 15 мин.

Чтобы констатировать отсутствие активности болезни (неактивная фаза болезни), пациент должен соответствовать всем перечисленным критериям. Фармакологическая клиническая ремиссия устанавливается в случае, если болезнь находится в неактивном состоянии на фоне лекарственной терапии в течение 6 мес подряд. Нефармакологическая клиническая ремиссия устанавливается в случае, если болезнь находится в неактивном состоянии в течение 12 мес подряд без противоревматических препаратов. Показатель «Продолжительность ремиссии» выражается в месяцах, прошедших с момента наступления неактивной фазы болезни.

