

Профиль назначения наружных лекарственных средств на основе мочевины

Концентрация	Эффект	Показания	Возрастные ограничения
Низкая (2–10%)	Гидратация	Базовая терапия при аллергодерматозах и ксерозе кожи (лицо, тело). Профилактика радиационно-индуцированного дерматита	До 2 лет
		Наследственные болезни ороговения (ихтиозы)	До 1 года
		Наследственные болезни ороговения (кератодермии; кератозы); зуд кожи при беременности	Без ограничений
Средняя (10–30%)	Гидратация. Кератолитический. Усиление местного действия лекарственных средств	Базовая терапия при аллергодерматозах и ксерозе кожи (тело); себорейный дерматит, ихтиоз, псориаз	До 5 лет
Высокая (30–50%)	Кератолитический. Усиление местного действия лекарственных средств	Устранение гиперкератоза (псориаз, ихтиозы, кератодермии, кератозы, мозоли и ороговелости); бородавки (обработка перед удалением); вросший ноготь (обработка перед подрезанием); онихомикоз	До 5 лет

Источник:

Альбанова В.И., Калинина О.В., Петрова С.Ю. Применение мочевины для коррекции нарушений кожного барьера. Вестник дерматологии и венерологии. 2022; 98 (4): 67-75. <https://doi.org/10.25208/vdv1329>