Лето - самое время активного отдыха!

НА ДАЧЕ С ДЕТЬМИ
НА ПИКНИКЕ С ДРУЗЬЯМИ

В ПОХОДАХ В ЛЕС И В ГОРЫ
НА МОРЕ С СЕМЬЕЙ

ВАЖНО, ЧТОБЫ МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ НЕ ПОДВОДИЛ

1

на экскурсиях

2

на долгой прогулке в парке

3

по дороге к отелю

САМОЕ ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ О НАДЕЖНОМ М-ХОЛИНОЛИТИКЕ!

СПАЗМЕКС

— уникальный по эффективности и безопасности М-холинолитик для лечения синдрома гиперактивного мочевого пузыря^{1,3,5}

1

в отличие от третичных аминов не проникает через гематоэнцефалический барьер³;

2

не метаболизируется системой цитохрома P450^{2,3};

3

хорошо переносится всеми группами пациентов^{1,6}.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ АНТИМУСКАРИНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ⁴

Сухость во рту
Сухость кожи
Расстройство ЖКТ
Задержка мочи
Аритмии
Нарушение зрения
Спутанность сознания
Головокружение
Сонливость
Головная боль
Повышенная возбудимость
Галлюцинации
Парестезии
Повышенное глазное давление
Сухость глаз
Аллергия
Крапивница
Боль в груди
Эозинофилия
Лихорадка

Троspия хлорид	X	X	X	X	X	X	Нет				X				
Оксибутинин	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			
Толтеродин	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
Солифенацин	X	X	X	X		X				(X)	X	X			

КАКИМИ ЕЩЕ ОЧЕВИДНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ОБЛАДАЕТ СПАЗМЕКС ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ М-ХОЛИНОЛИТИКАМИ?³

Различия М-холинолитиков (между третичными и четвертичными аминами)	Третичные амины (оксибутинин, толтеродин, солифенацин)	Четвертичные амины (троspия хлорид)
Проникают через гематоэнцефалический барьер, вызывают: расстройства сна; расстройства внимания, в том числе ошибки при вождении автомобиля; сонноценцию и пр.	✓	сравнимо с плацебо
Отрицательное влияние на когнитивные функции	✓	нет
Взаимодействие с изоферментами цитохрома P450 лекарственные взаимодействия	✓	нет
Тропность к м-холинорецепторам мочевого пузыря	✓	✓✓
Дополнительное местное воздействие на уретерий	нет	✓
Скорость наступления эффекта	через 2-5 недель	на 1-й неделе

ОТЛИЧНО ПРОВЕСТИ ЛЕТО?

СО СПАЗМЕКСОМ ЭТО ВОЗМОЖНО!

СПАЗМЕКС — ПРЕПАРАТ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРАКТИВНОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

1. Кривобородов Г.Г., Тур Е.И., Ефремов Н.С., Школьников М.Е. Высокие дозы троспия хлорида у больных с гиперактивным мочевым пузырем вследствие неврологических заболеваний. Данные мультицентровой наблюдательной программы ресурс. Consilium Medicum. 2015; 17 (12): 64-67.

2. Biastre K, Burnakis T. Trospium chloride treatment of overactive bladder. Ann Pharmacother. 2009 Feb;43(2):283-95. doi: 10.1345/aph.1L160. Epub 2009 Feb 3. PMID: 19193592.

3. Abrams P, et al. Incontinence: 5th International Consultation on Incontinence, Paris, February 2012. 5th Edition, ICUD-EAU 2013.

4. Int J Clin Pract. 2010 авг., 64 (9): 1294-300.

5. Margulis A.V., Hallas J., Pottgard A. et al. Comparison of cardiovascular events among treatments for overactive bladder: a Danish nationwide cohort study. Eur J Clin Pharmacol. 2018;74(2):193-199.

6. Г.Г. Кривобородов, Е.В. Кульчаева. Актуальные вопросы Урологии и андрологии. Справочник поликлинического врача 1 № 5, 1, 2019.

Информация для медицинских и фармацевтических работников.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ