Алгоритм действия врача

Первичная и уточняющая диагностика рака мочевого пузыря

Схема первичной диагностики рака мочевого пузыря

Рак мочевого пузыря

Определение глубины инвазии и вовлечения окружающих органов:
- трансректальное УЗИ
- компьютерная/магнитно-резонансная томография (КТ/МРТ) малого таза
- ТУР-биопсия мочевого пузыря
- ирригоскопия
- вагинальное исследование в зеркалах

Определение распространения по слизистой оболочке
- флюоресцентная уретроцистоскопия с локальной спектрометрией
- метод случайных биопсий

Определение категории N:
- трансректальное УЗИ
- КТ/МРТ малого таза
- лимфаденэктомия

Определение отдаленных метастазов:
- УЗИ брюшной полости
- рентгеновское исследование легких
- КТ/МРТ брюшной полости, грудной клетки
- радиоизотопное исследование скелета
- КТ головного мозга

Схема уточняющей диагностики рака мочевого пузыря

Рак мочевого пузыря

Лабораторная диагностика:
- микрогематурия
- цитологическое исследование мочи
- опухолевые маркеры UBC/BTA
- трехстаканная проба

Симптомы:
- макрогематурия
- дизурия
- учащенное мочеиспускание
- боли над лобком
- жжение в области уретры

Физикальное обследование:
- трансректальное обследование
- бимануальная пальпация

Инструментальная диагностика:
- УЗИ мочевого пузыря
- уретроцистоскопия
- биопсия мочевого пузыря
- ТУР-биопсия мочевого пузыря

Источник:

Рак мочевого пузыря. Клинические рекомендации. 2023.

DigitalDoctor